



Demandez au patient :

1. Au cours des dernières semaines, avez-vous souhaité être mort ? Oui Non

2. Au cours des dernières semaines, avez-vous pensé que vous ou votre famille seriez mieux si vous étiez mort? Oui Non

3. Au cours des dernières semaines, avez-vous pensé à vous suicider ? Oui Non

4. Avez-vous déjà essayé de vous suicider ? Oui Non

Si Oui, comment ? _____

Quand ? _____

Si le patient répond **Oui** à l'une de ces questions, posez-lui cette question relative à l'acuité :

5. Pensez-vous en ce moment à vous suicider ? Oui Non

Prochaines étapes :

Si le patient a répondu « Non » aux questions 1 à 4, le dépistage est terminé (il est inutile de poser la question n° 5). Il n'est pas nécessaire d'intervenir (*Note : Le jugement clinique peut toujours annuler un dépistage négatif).

Si le patient a répondu « Oui » à l'une des questions 1 à 4, ou refusé de répondre, il s'agit d'un **dépistage positif**. Posez la question n° 5 afin d'évaluer l'acuité :

« Oui » à la question n° 5 = **dépistage positif aigu** (risques imminents identifiés)

- Le patient nécessite une **évaluation complète de santé mentale/sécurité STAT**.
- **Le patient ne peut partir sans être soumis à une évaluation de sécurité.**
- Surveillez le patient. Retirez de la chambre tout objet dangereux. Avertissez le médecin ou le clinicien responsable du soin au patient.

« Non » à la question n° 5 = **dépistage positif non aigu** (risques potentiels identifiés)

- Le patient nécessite une **brève** évaluation de sécurité quant au suicide afin de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une **évaluation complète** de santé mentale.
- **Le patient ne peut partir sans être soumis à une évaluation de sécurité.**
- Avertissez le médecin ou le clinicien responsable du soin au patient.

Offrez les ressources à tous les patients

- 24/7 Ligne nationale de prévention du suicide 1-800-273-TALK (8255) - En Espagnol : 1-888-628-9454
- 24/7 Crisis Text Line : Envoyer un SMS avec le mot « HOME » au 741-741